



Slovenská spoločnosť
všeobecného praktického lekárstva SLS
www.vpl.sk

XXX. VÝROČNÁ KONFERENCIA

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
KĽÚČ K ZLEPŠENIU
ZDRAVOTNÍCKEHO SYSTÉMU

Bojnice 15. – 17. október 2009



www.vpl.sk

XXX. VÝROČNÁ KONFERENCIA

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ KĽÚČ K ZLEPŠENIU ZDRAVOTNÍCKEHO SYSTÉMU

Bojnice 15. – 17.10.2009

Nad konferenciou všeobecných praktických lekárov prevzal záštitu minister zdravotníctva SR MUDr. Richard Raši, MPH

Konferencia sa koná s podporou Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EURO), Európskeho fóra pre primárnu starostlivosť (EFPC) a Asociácie na ochranu práv pacientov(AOPP)

- Postavenie primárnej starostlivosti doma aj v zahraničí
- Nové kompetencie
- Upgrade vedomostí
- Preventívne zameranie
- Spolupráca
- Financovanie praxí

PREDSEDNÍCTVO A ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:

MUDr. Karol Herda, past prezident SSVPL SLS, predseda organizačného výboru konferencie,
herda@bojnice.sk, mobil: 0907 361 739

MUDr. František Klimo, čestný prezident SSVPL SLS

MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS a prezident 51.konferencie
lipp@pobox.sk, mobi: 0903 440 016

MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku
dse@euro.who.int, mobil: 0903 420 378

MUDr. Zuzana Nedelková, viceprezident pre kvalitu SSVPL SLS
nedamb@kios.sk, mobil: 0905 263 115

MUDr. Jana Bendová, SSVPL SLS
jana_bendova@hotmail.com, mobil: 0903 131 311

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko v Bojniciach, Hurbanovo námestie 41, BOJNICE.

Prezentácia účastníkov: 15. až 17. Októbra 2008 od 7. 30 hod.

KONGRESOVÝ POPLATOK:

1. na mieste pri registrácii **25 EUR** pre členov SSVPL SLS, **30 EUR** pre nečlenov
2. písomne prihlásení do 30. 9. 2009 – **20 EUR** pre členov SSVPL SLS, **25 EUR** pre nečlenov SSVPL SLS.
Študenti, nepracujúci dôchodcovia, sprevádzajúce osoby a zdravotné sestry platia polovičné poplatky.

Voľný vstup majú prednášatelia, hostia a výbor SSVPL SLS.

Členovia, prineste si k registrácii nové členské preukazy s logom WHO.



UBYTOVANIE JE MOŽNÉ SI ZABEZPEČIŤ SAMOSTATNE V NASLEDUJÚCICH UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH:

HOTELY

POD ZÁMKOM****, Hurbanovo nám. 2, 972 01 Bojnice

046/540 2650, 046/518 5100, 046/518 5300

e-mail: recepthotel@stonline.sk, vavrospol@stonline.sk

web stránka: www.hotelpodzamkom.sk

KASKÁDA****, Jánošíková 1301/24, 972 01 Bojnice

046/518 3010, e-mail: hotel@kaskada.sk

web stránka: www.kaskada.sk

REGIA DAMONA**, Zámok a okolie 3, 972 01 Bojnice

046/543 0991, e-mail: info@hoteldamona.sk

web stránka: www.hoteldamona.sk

MADO HOTEL GARNI, Jesenského 15, 972 01 Bojnice

046/543 0170, 543 0072, e-mail: ck@mado.sk

web stránka: www.mado.sk/hotel

PENZIÓNY

ALENA, Cintorínska 10, 972 01 Bojnice

0905 247 299, e-mail: penzion-alena@szm.sk

web stránka: www.penzion-alena.szm.sk

BOJNICE, Prievdzská 39, 972 01 Bojnice

046/540 2141, e-mail: penzionbojnice@stonline.sk

web stránka: www.penzionbojnice.sk

DRUŽBA, Rekreačná 2, 972 01 Bojnice

046/540 2113, 0903 571 091, e-mail: penzion@druzba.sk

web stránka: www.druzba.sk

ELITEX **, Prievdzská 10, 972 01 Bojnice

046/541 1990, e-mail: oc-zora@max.sknet.sk

web stránka: www.oczora.wz.cz

JAS, Školská 20, 972 01 Bojnice

0905 604471, 0905 481065, e-mail: pension.jas@stonline.sk

web stránka: www.pensionjas.szm.sk

MAXIM, Rekreačná 1485, 972 01 Bojnice

0905 315 009, e-mail: maxim@maxim-penzion.sk

web stránka: www.penzion-maxim.szm.sk

MICHAL A TONKA, Sládkovičová 7, 972 01 Bojnice

0904 043 039, 0903 801 621

POD ZÁMKOM, Hurbanovo nám. 25/13, 972 01 Bojnice

046/541 2963, e-mail: enuska@stonline.sk

BODOVÉ OHODNOTENIE: 20 KREDITOV CME

Spoločenský večer SSVPL SLS:

16.októbra 2009 od 20.00 do 24.00

SPONZORI A VYSTAVOVATELIA:

Generálny sponzor: GlaxoSmithKline

Hlavný sponzor:

Gedeon Richter, Hartmann Rico

Ostatní sponzori a vystavovatelia:

AOPP, 7R Panmed, Berlin – Chemie, Bio G, Celimed, COMPEK MEDICAL SERVICES, CSC Pharmaceuticals, Danone, Data Center, EGIS, Eurolab Lambda, GENERICA, KRKA, Medochemie, MEDPREV, NYCOMED, Orion Diagnostica, Pharma Nord, SCA Hygiene Products, Sanofi Pasteur, Solvay Pharma, Servier, Swiss Pharma, TANGRA, URSAPHARM, Valeant.

Rokovacie jazyky: Slovenčina, Čeština, Angličtina

Simultánne tlmočenie prednášok v piatok v kinosále počas celého dňa.

Postery:

- 1.** Dátový projekt SSVPL – Katarína Tesárová
- 2.** Cievny projekt SSVPL – Ján Kaňuch
- 3.** Spiroprojekt SSVPL – Jana Bendová, Iveta Vaverková
- 4.** Projekt kvality SSVPL SLS – Peter Lipták
- 5.** Diaprojekt SSVPL SLS – Peter Lipták, Tomáš Hybský
- 6.** HP Projekt SSVPL SLS – Lenka Kostková
- 7.** Onkologické preventívne projekty SSVPL – Lenka Kostkova, Peter Lipták
- 8.** Videoposter – Svetový deň srdca – výsledky VLD, Tomáš Janík, Peter Lipták
- 9.** Pracovná rehabilitácia občanov so zdravotným postihnutím – Igor Hajdúk
- 10.** Postery zahraničných účastníkov


PRESTANCE®

perindopril arginín/amlodipín besilát



Hypertenzia, koronárna choroba srdca

1 tableta denne



FIXNÁ KOMBINÁCIA SO SYNERGICKÝM ÚČINKOM PRE KARDIOVASKULÁRNU OCHRANU VAŠICH PACIENTOV

- ▶ Účinná kontrola tlaku krvi¹
- ▶ Lepšia kardiovaskulárna ochrana²
- ▶ Lepšia compliance¹



PRESTANCE

Zloženie: Každá tableta obsahuje perindopril arginín, dlhodobopôsobiaci ACE-inhibitor a amlodipín besilát, blokátor kalciových kanálov. PRESTANCE 5mg/5mg: jedna tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 5 mg perindoprilu arginínu a 6,935 mg amlodipínu besilátu, množstvo zodpovedajúce 5 mg amlodipínu. PRESTANCE 5mg/10mg: jedna tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 5 mg perindoprilu arginínu a 13,870 mg amlodipínu besilátu, množstvo zodpovedajúce 10 mg amlodipínu. PRESTANCE 10mg/5mg: jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 10 mg perindoprilu arginínu a 6,935 mg amlodipínu besilátu, množstvo zodpovedajúce 5 mg amlodipínu. PRESTANCE 10mg/10mg: jedna tableta obsahuje 6,790 mg perindoprilu, množstvo zodpovedajúce 10 mg perindoprilu arginínu a 13,870 mg amlodipínu besilátu, množstvo zodpovedajúce 10 mg amlodipínu. **Pomocná látka:** monohydrát laktózy. **Indikácie:** PRESTANCE je indikované ako substitučná terapia na liečbu esenciálnej hypertenzie a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca u pacientov, ktorí sú už kontrovaní perindoprilom a amlodipínom podávanými súběžne v rovnakých dávkových hladinách. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Perorálne použitie. Jedna tableta denne, užitá ako jednotlivá dávka, prednostne ráno a pred jedlom. Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatková terapia. Ak je potrebná zmena dávkovania, môže sa dávka PRESTANCE upraviť alebo sa môže zväčšiť individuálna titrácia voľnou kombináciou. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na perindopril alebo na niektorý iný ACE inhibitor, anamnéza angioedému súvisiaceho s predchádzajúcou liečbou ACE inhibitorom, hereditárny alebo idiopatický angioedém, tehotenstvo a dojčenie, závažná hypotenzia, precitlivosť na amlodipín alebo na niektorý iný dihydropyridín, šok, vrátane kardiogénneho šoku, obštrukcia prietoku ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy), nestabilná angína pectoris, zlyhanie srdca po akútnom infarkte myokardu (počas prvých 28 dní). **Liekové a iné interakcie:** Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča: draslík šetriace diuretiká a niektoré lieky spôsobujúce poruchy srdcového rytmu, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka, kombinácia s lítom, estramustín, antipsychotiká, anestetiká, imunosupresíva. **Nežiaduce účinky:** asténia, závraty, bolesť hlavy, zmeny nálad, poruchy spánku, svalové kŕče, hypotenzia, alergická reakcia, kožné vyrážky, gastrointestinálne poruchy, kašeľ, suchosť v ústach, riziko dehydratácie u starších a u pacientov s hypovolémiou spôsobenou napr. liečbou diuretikami alebo po podaní prvých dávok. U pacientov užívajúcich diuretiká zastavte diuretikú liečbu 3 dni pred začatím liečby perindoprilom/arginínom/amlodipínom. Diuretikum môže byť podávané v kombinácii neskor, ak je to potrebné. Draslík šetriace diuretiká sa neodporúčajú. Pacienti s hepatálnym poškodením: plazmatický polčas amlodipínu je predĺžený. Preto je potrebné liek podávať opatrne a liečba má zahŕňať bežné lekárske sledovanie pečenej funkcie. U tretiny pacientov so srdcovým zlyhaním liečba amlodipínom bola spojená s častejším výskytom pľúcneho edému, pričom rozdiel oproti placebo nebol štatisticky významný. Pacientom sa má liečba podávať opatrne. Súbežné použitie, ktoré je potrebné vziať do úvahy (pozri Liekové a iné interakcie). **Balenie:** 30 tabliet. **Dátum poslednej revízie textu:** Máj 2008. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek je čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.

Plnú verziu Súhrnu charakteristických vlastností lieku PRESTANCE nájdete na stránke spoločnosti Servier alebo Vám ho poskytneme na adresu:

Servier Slovensko, spol. s r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690, www.servier.sk

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Les Laboratoires Servier, 22 rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francúzsko.

1. Bahl UK. Fixed dose perindopril and amlodipine in moderate-to-severe hypertension. 14th World Congress of Heart Disease 2008, Toronto, Canada. 2. Meurin P. The ASCOT trial. Clarifying the role of ACE inhibition in the reduction of cardiovascular events in patients with hypertension. Am J Cardiovasc Drugs 2006; 6: 327-334.



Servier Slovensko, spol. s r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, tel.: 02/59204111, fax: 02/54432690, www.servier.sk

Odborný program:

Štvrtok 15. 10. 2009

Kinosála

A • 9.30 – 10.30 – Slávnostné otvorenie

MUDr. Peter Lipták, prezident SSVPL SLS a prezident konferencie
a MUDr. Karol Herda past prezident SSVPL SLS a predseda
organizačného výboru

Pozdravy hostí

MZ SR - pozvaný minister zdravotníctva MUDr. Richard Raši, MPH
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident SLS
Prof. MUDr. Peter Labaš, PhD, dekan LFUK
JUDr. Eva Madajová, predsedníčka AOPP
Doc. MUDr. Svatoslav Býma, CSc., predseda SVL ČLS JEP

• Slávnostné fanfáry

Odovzdanie cien a pôct SLS : Rozália Vrábelová (Bratislava),
František Klimo (Senica), Alexander Heveši (Kálná n Hronom),
Eva Vargová (Košice), Ivona Tisoňová (Bratislava), Karol Herda
(Bojnice), Milan Šimunič (Bratislava), Ľudo Lehoták (Nitra),
Karol Mika (Banská Bystrica), Jozef Spaček (Trenčín).

*Udelenie Dikantovej ceny SSVPL SLS za prednáškovú a publikačnú
činnosť - MUDr. Imrichovi Ceconíkovi in memoriam.*

Prejavy a pozdravy ocenených.

Prestávka 30 – min.

B • 11.00 – 12.00 – 60 min.

1. MUDr. Peter Lipták, – 30 rokov primárnej starostlivosti
na Slovensku
2. MUDr. Igor Karen (SVL ČLS JEP) – Současný stav primární péče
v ČR.
3. Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. – EBM odporúčania a miesto
spolupráce pri manažmente pacienta v praxi (Najskôr pacient a po-
tom kompetencie a záujmy odborov a špecializácii)

Prestávka na obed do 13.00 hod.

Fraxiparine®
nadroparin

FRAXIPARINE FORTE®
nadroparin

OVERENÁ¹, ÚČINNÁ² A BEZPEČNÁ³

PROFYLAXIA VTE

LIEČBA VTE



Fraxiparine – Skrátená informácia o lieku:

Názov pripravku: Fraxiparine. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Glaxo Group Limited, Greenford, Veľká Británia. Zloženie: Nadroparinum calcicum 9500 IU antiXa v 1 ml roztoku. Pomocné látky: acidum hydrochloricum dilutum alebo calci hydroxidum solutio k úprave pH (5-7,5), aqua pro iniectione. Lieková forma: injekčný roztok. Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulant, antitrombotikum. ATC kód: B01AB06. Indikácie: Prevencia tromboembolickej choroby, liečba tromboembolickej choroby, prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy, liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu. Kontraindikácie: – precitlivosť na nadroparin alebo pomocné látky, anamnéza trombocytopénie počas liečby nadroparinom, aktívne krvácanie alebo zvýšené riziko krvácania v súvislosti s poruchami krvnej zrážalivosti s výnimkou diseminovanej intravaskulárnej koagulačie nevyvolanej heparinom, orgánová lézia s rizikom krvácania (napr. aktívny peptický vred), hemoragická cievná mozgová príhoda, aktívna infekčná endokarditída, závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min). Liekovky na viacnásobné použitie obsahujú benzylalkohol, leziečujúce účinky. Krivčavé prejavy trombocytopénie, ezofagitída, malé krvné výrony a kožné nekrózy v mieste vpichu, generalizované reakcie precitlivosti vrátane angioedému, prechodné zvýšenie transamináz, výnimočné príznaky, reverzibilná hyperkáliaemia súvisiaca s heparinom vyvolanou supresiou aldosterónu. Dávkovanie: Prevencia tromboembolickej choroby: všeobecná chirurgia – Fraxiparine 0,3 ml subkutánne 2-4 hodiny pred operáciou a potom raz denne najmenej 7 dní; ortopediá – prvá dávka 12 hodín pred operáciou a druhá dávka 12 hodín po skončení operácie podľa telesnej hmotnosti, pokračovať najmenej 10 dní. Liečba tromboembolickej choroby: 2x denne (každých 12 hodín) po dobu 10 dní podľa telesnej hmotnosti (viď príbalová informácia). Prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy: obvykle sa podáva v jednej dávke do arteriálnej línie na začiatku každého cyklu u pacientov bez zvýšeného rizika krvácania: pod 50 kg 0,3 ml, 50-69 kg 0,4 ml, nad 70 kg 0,6 ml, u pacientov so zvýšeným rizikom polovičná dávka. Liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu: podáva sa 2x denne (každých 12 hodín) s kyselinou acetylsalicyloylovou v dávke do 325 mg denne. Zvyšujúca dĺžka liečby je 6 dní. Druhá dávka sa podáva formou bolusovej intravenózneho injekcie a pokračuje sa subkutánne v dávke 80 IU anti Xa/kg. Porucha funkcie obličiek: U pacientov s mierou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 50 ml/min) nie je potrebné znížiť dávku. U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu > 30 ml/min a < 50 ml/min) je potrebné znížiť dávku nadroparinu o 25 až 33 %. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je prevencia tromboembolickej choroby je potrebné znížiť dávku nadroparinu o 25 až 33 %. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek pri liečbe tromboembolickej choroby, nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu je Fraxiparine kontraindikovaný. Spôsob podávania: Fraxiparine je určený pre subkutánne podanie s výnimkou podania pri hemodialýze a bolusovej dávke pri liečbe NAP a non-Q IMI. Osobitné upozornenie: vzhľadom na možnosť vzniku trombocytopénie vyvolanej heparinom je počas celej liečby nadroparinom potrebné sledovať počet trombocytov. Zvýšená opatnosť pri podávaní nadroparinu je potrebná u pacientov so zlyhaním pečene, poruchou funkcie obličiek, závažnou arteriálnou hypertenziou, anamnézou vredovej choroby, chorioretinálnymi cievnymi poruchami, v období po operáciách mozgu, miechy a oka. Krv týchto naplnenej injekčnej striekačky obsahujú vysušenu prírodnú latexovú gumu, ktorá môže vyvolať alergické reakcie u jedincov citlivých na latex. Liekové a iné interakcie: Nadroparin sa musí opatrne podávať pacientom užívajúcim perorálne antikoagulanty, kortikosteroidy a destry. Deti a dospievajúci: Nadroparin sa neodporúča podávať u detí a dospievajúcich. Strážny príznam: Pred začatím liečby sa odporúča vyšetriť funkcie obličiek. Gravidita a laktácia: Použitie nadroparinu počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak prínos liečby je vyšší ako jej možné riziká. Použitie nadroparinu počas dojčenia sa neodporúča. Balenie: Fraxiparine inj 10 x 0,3 ml, Fraxiparine inj 10 x 0,4 ml, Fraxiparine inj 10 x 0,6 ml, Fraxiparine inj 10 x 0,8 ml, Fraxiparine inj 10 x 1,0 ml, Fraxiparine multidoze inj 10 x 5 ml. Uchovávanie: pri teplote do 25°C. Vydať lieky je vyznaný na lekársky predpis. Dátum poslednej revízie textu: 09/2008.

Skrátená informácia o lieku:

Fraxiparine Forte, Glaxo Group Limited, Greenford, Veľká Británia. Zloženie: Nadroparinum calcicum 19 000 IU antiXa v 1 ml roztoku. Pomocné látky: acidum hydrochloricum dilutum alebo calci hydroxidum solutio k úprave pH (5-7,5), aqua pro iniectione. Lieková forma: injekčný roztok. Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulant, antitrombotikum. ATC kód: B01AB06. Indikácie: Liečba tromboembolickej choroby, prevencia zrážania krvi počas hemodialýzy, liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu. Kontraindikácie: – precitlivosť na nadroparin alebo pomocné látky, anamnéza trombocytopénie počas liečby nadroparinom, aktívne krvácanie alebo zvýšené riziko krvácania v súvislosti s poruchami krvnej zrážalivosti s výnimkou diseminovanej intravaskulárnej koagulačie nevyvolanej heparinom, orgánová lézia s rizikom krvácania (napr. aktívny peptický vred), hemoragická cievná mozgová príhoda, aktívna infekčná endokarditída, závažná porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min). Liekovky na viacnásobné použitie obsahujú benzylalkohol, leziečujúce účinky. Krivčavé prejavy trombocytopénie, ezofagitída, malé krvné výrony a kožné nekrózy v mieste vpichu, objavenie pemphigových/syfilizovaných reakcií precitlivosti vrátane angioedému, prechodné zvýšenie transamináz, priapizmus, reverzibilná hyperkáliaemia súvisiaca s heparinom vyvolanou supresiou aldosterónu, raz denne počas 10 dní na základe telesnej hmotnosti (viď príbalová informácia). Porucha funkcie obličiek: U pacientov s mierou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek je potrebné znížiť dávku nadroparinu o 25 %. Nadroparin je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek. Prípravok je určený pre subkutánne podanie. Vzhľadom na možnosť vzniku trombocytopénie vyvolanej heparinom je počas celej liečby nadroparinom potrebné sledovať počet trombocytov. Zvýšená opatnosť pri podávaní nadroparinu je potrebná u pacientov so zlyhaním pečene, poruchou funkcie obličiek, závažnou arteriálnou hypertenziou, anamnézou vredovej choroby, chorioretinálnymi cievnymi poruchami, v období po operáciách mozgu, miechy a oka. Tieto stavy môžu byť sprevádzané výšim krvácaním. Krv týchto naplnenej injekčnej striekačky obsahujú vysušenu prírodnú latexovú gumu, ktorá môže vyvolať alergické reakcie u jedincov citlivých na latex. Nadroparin sa musí opatrne podávať pacientom užívajúcim perorálne antikoagulanty, kortikosteroidy a destry. Deti a dospievajúci: Nadroparin sa neodporúča podávať u detí a dospievajúcich. Strážny príznam: Pred začatím liečby nadroparinom vyšetriť obličkové funkcie. Gravidita a laktácia: Použitie nadroparinu počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak prínos liečby je vyšší ako jej možné riziká. Použitie nadroparinu počas dojčenia sa neodporúča. Jednorazové striekačky s bezpečnostným systémom. Fraxiparine forte sol inj 10 x 0,6 ml, Fraxiparine forte sol inj 10 x 0,8 ml, Fraxiparine forte sol inj 10 x 1,0 ml. Uchovávanie: pri teplote do 25°C. je vyznaný na lekársky predpis. 09/2008. Pred predpisovaním sa obzámňte s úplnou informáciou o lieku.

Literatúra
1. SPC Fraxiparine, SPC Fraxiparine Forte, 2. Sennicke ACCP 2008 (American College of Chest Physicians); 3. Koopman MW at al. Treatment of VTE with intravenous unfractionated heparin administered in the hospital as compared with subcutaneous LMWH administered at home. New England Journal of Medicine 1996; 334(11):682-687.



GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.; Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, Tel: 02 / 4826 1111, Fax: 02 / 4826 1110
www.gsk.sk; www.medforum.sk

Kinosála

A • 13.00 – 14.00 – Pneumológia I – Astma bronchiale – 60 min.

Koordinátor: J. Bendová

1. Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. - Astma bronchiale - epidemiológia, súčasná diagnostika, liečba a manažment diagnózy
2. MUDr. Jana Bendová. VLD Veľký Biel - Starostlivosť o pacienta s AB v ambulancii VLD

Prestávka 20 min.

B • 14.20 – 15.20 – Diabetes mellitus – 60 min.

Koordinátor: P. Lipták

1. Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. (LF UPJŠ, Košice): Syndróm spánkového apnoe a diabetes mellitus - 25 min
2. MUDr. Peter Lipták, MUDr. Tomáš Hybský: Diaprojekt SSVPL – súčasný stav.
3. MUDr. Igor Karen (SVL ČLS JEP): Péče o diabetika v primárnej péči v ČR.

Prestávka 20 min.

C • 15.40 – 16.40 – Hematológia I – Tromboembolizmus, nízkomolekulárny heparín – 60 min.

Koordinátor: P. Lipták

1. Prof. MUDr. Peter Labaš, PhD, dekan LFUK, prednosta 1. Chirurgickej kliniky FN a LFUK – Tromboembolizmus, operácia sa podarila, pacient zomrel, kazuistiky
2. Prim. MUDr. Hulíková, PhD – Tromboembolizmus z pohľadu hematológa, liečba a prevencia tromboembolizmu nízkomolekulárnymi heparínmi

Prestávka 20 min.

D • 17.00 – 18.00 – KV prevencia „Deň srdca 2009“ – 60 min.

Predsedenstvo:

Š. Farský, J. Murín, I. Riečanský, Z. Nedelková, P. Lipták, P. Marko

1. Prof. MUDr. J. Murín – Vyhodnotenie aktivít Dňa srdca – 29. septembra 2009.
2. Prof. MUDr. Igor Riečanský – História a súčasnosť kardiovaskulárnej prevencie na Slovensku.



Dir[®]norm
amlodipine 5mg, lisinopril 10mg

Znásobte šancu + ochranný vplyv lisinoprilu

dosiahnuť cieľ



GEDEON RICHTER

ZLOŽENIE: Každá tableta obsahuje 10 mg lisinoprilu (ako dihydrát lisinoprilu) a 5 mg amlodipínu (ako amlodipínumbesilát). **INDIKÁCIE:** Liečba esenciálnej hypertenzie. Dironorm je indikovaný ako substitučná liečba pacientov s krvným tlakom adekvátne kontrolovaným lisinoprilom a amlodipínom, ktoré sa podávajú súčasne v tých istých dávkach. **DÁVKOVANIE:** Odporúčaná dávka je jedna tableta denne. Môže sa užívať nezávisle od jedla. **Pacienti s renálnym poškodením:** pacienti sa musia individuálne titrovať za použitia jednotlivých zložiek lisinoprilu a amlodipínu. Dironorm je indikovaný iba pre pacientov s vytýtrovanou optimálnou udržiavacou dávkou lisinoprilu 10 mg a amlodipínu 5 mg. Počas liečby sa má monitorovať renálna funkcia, hladiny sérovej draslíka a sodíka. **Pacienti s poškodením pečene:** môže byť predĺžené vylučovanie amlodipínu. Keďže sa nesteroidy žiadne presné odporúčania pre dávkovanie u takýchto prípadov, liek sa musí podávať s opatrnosťou. **Deti a adolescenti:** Dironorm sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti. **Starší pacienti (> 65 rokov):** V klinických štúdiách sa nedetila žiadna zmena účinnosti alebo bezpečnostného profilu amlodipínu alebo lisinoprilu, ktorá by súvisela s vekom. **KONTRAINDIKÁCIE:** Precitlivosť na lisinopril alebo akýkoľvek iný ACE inhibitor. Precitlivosť na amlodipín alebo akýkoľvek iný derivát dihydropyridínu. Precitlivosť na ktorúkoľvek z pomocných látok. **Ťažká hypotenzia.** Angioedém spojený s predchádzajúcou liečbou ACE inhibitorom v anamnéze. Hereditárny alebo idiopatický angioedém. Hemodynamicky významná obštrukcia výtokového traktu ľavej komory, mitrálna stenóza alebo kardioembolizácia. Srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu (počas prvých 28 dní). Nestabilná angína pectoris (s výnimkou Prinzmetalovej angíny). Gravidita a laktácia. **OSOBITNÉ UPOZORNENIA:** **Symptomatická hypotenzia** sa môže vyskytnúť u pacientov s objemovou a/alebo sodíkovou depleciou. **Renálne poškodenie:** K zisteniu optimálnej udržiavacej dávky u pacientov s poškodením funkcie obličiek sa musia pacienti individuálne titrovať pri použití jednotlivých zložiek lisinoprilu a amlodipínu pri pozornom sledovaní funkcie obličiek. **Angioedém:** U pacientov liečených inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu, vrátane lisinoprilu, bol hlásený angioedém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtanu. V takýchto prípadoch sa musí Dironorm ihneď vysadiť a pacient musí byť pod prísnym lekárskej dohľadom do vymiznutia príznakov. **Chirurgia/celková anestézia.** **Hyperkalémia.** U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi boli pozorované zvýšené hladiny sérovej draslíka. **INTERAKCIE:** **Interakcie spojené s lisinoprilom:** **Diuretiká** **šetriace draslík**, doplnky draslíka - môže dôjsť k hyperkalémii v kombinácii s ACE inhibítormi. **Diuretiká** v kombinácii s Dironormom je antihypertenzívny účinok zvýčajne aktívny. **ICA** **antipsychotiká** **anestetiká** **narkotiká**: Súčasné podávanie s ACE inhibítormi môže viesť k ďalšiemu zníženiu krvného tlaku. **Antidiabetiká**: súčasné podávanie ACE inhibitorov a antidiabetík môže spôsobiť zosilnenie účinku na zníženie krvného cukru s nízkym hypoglykémie. **NSAID**: Chronické podávanie NSAID, vrátane vysokých dávok, kyseliny acetylsalicylicovej > 3 g/den môže zosilniť antihypertenzný účinok ACE inhibitoru. **NSAID** a ACE inhibítory vykazujú aditívny účinok na zvýšenie sérovej draslíka a môžu viesť k poškodeniu renálnej funkcie. **Lítium:** Počas súčasného použitia ACE inhibitora môže byť znížené vylučovanie lítia, a preto sa musia monitorovať hladiny sérovej lítia. **Interakcie spojené s amlodipínom:** **CYP3A4** inhibítory môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu amlodipínu. **CYP3A4** indukcie: je indikované klinické monitorovanie s možnou upravou dávkovania amlodipínu počas liečby induktorom a po jeho vysadení. **GRAVIDITA A LAKTÁCIA:** Dironorm je počas gravidity kontraindikovaný. Dironorm sa neodporúča pre dojčiacu matku. **NEŽIADUCE ÚČINKY:** Počas kontrolovanej klinickej štúdie (n=195) neboli výskyt nežiaducich účinkov vyšší u jedincov liečených obidvoma liečivami súčasne ako u pacientov na monoterapii. Nežiaduce účinky boli obmedzené na tých, u ktorých boli hlásené v minulosti v súvislosti s amlodipínom a/alebo lisinoprilom. Nežiaduce účinky boli zvyčajne mierne, prechodné a zriedka si vyžadovali prerušenie liečby Dironormom. Najčastejšie nežiaduce účinky kombinácie boli bolesti hlavy (8%), kašeľ (5%) a závrat (3%). Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby lisinoprilom a amlodipínom nezávisle: nauzea, ortostatická hypotenzia, hnačka, vracanie, renálna dysfunkcia, impotencia, gynekostáza, zvýšenie urey v krvi, zvýšenie sérovej kreatinínu, hyperkalémia, zvýšenie hepatických enzýmov, zníženie hemoglobínu, zníženie hematokritu, zvýšenie sérovej bilirubínu, hyponatremia. **DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII:** Gedeon Richter Plc, Győmői út 19-21 1103 Budapest, Maďarsko. **REGISTRÁCNE ČÍSLO:** 58/0431/08-5. **BALENIE:** 30 tabliet. **REGISTRÁCNE číslo:** September 2008. **DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU:** Marec 2009. Liek je vizuálny na lekárskej predpis a je čiastočne hrađený s verejného zdravotného poistenia. Určené pre odbornú verejnosť. Dátum prijatý: April 2009. Pred použitím Dironormu sa oboznámte s plným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Gedeon Richter - Šoltéssovej 14, 81 08 Bratislava - tel.: (02) 50 20 58 01 - fax: (02) 50 20 58 13 - richtergedeon@richter.sk - www.richter.sk

DIN SK 01/2009/05

3. MUDr. Peter Marko – Ukazovatele kardiovaskulárnej morbidity a mortality v rómskej komunite – komunitný rozmer starostlivosti v práci VLD .
4. Doc. MUDr. Štefan Farský, MUDr. Peter Lipták – Koncepcia KV prevencie postavená na VL, zhodnotenie zapojenia VLD do tohoročného Dňa srdca.
5. Vylosovanie výhercu - z VLD účastníkov Dňa srdca 2009 – počítačového EKG zakúpeného s podporou WHO Europe v hodnote 3 333 EUR. Prekvapenie.

Kongresová sála

A • 13.00 – 14.00 – Biologická liečba, novinka v liečbe v GE, reumatológii a dermatológii – 60 min.

Koordinátor: I. Páv

1. Reumatológia: Doc. MUDr. Zdenko Kilinger
2. Dermatológia: Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
3. Gastroenterológia: MUDr. Igor Páv
4. Pohľad pneumológa na riziká biologickej liečby: Doc. MUDr. Ivan Solovič

Prestávka 20 min.

B • 14.20 – 15.20 – ABC z dermatológie – 60 min.

Koordinátorka: prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

1. Ekzém verus dermatitída
2. Mikrobiálny ekzém
3. Mykotické ochorenia kože a nechtov
4. Ochorenia kože a kožné prejavy spôsobené hmyzom

Prestávka 20 min.

C • 15.40 – 16.40 – Sympóziu o bolesti – 60 min.

Koordinátor: P. Pekarovič

1. MUDr. Bohumil Skála (SVL ČLS JEP)– Doporučené postupy pro léčbu bolesti pro VL v ČR – aktualizace 2009
2. MUDr. Broďáni Dušan, PhD – novinky v liečbe bolesti

Prestávka 15 min.

Cenovo najvýhodnejší imunologický test na stanovenie okultného krvácania **SureScreen FOB**


0,85 EUR s DPH (25,50 Sk)

za kompletný test

(testovacia platnička + predplnená odberová nádoba + návod pre pacienta)

diéta nie je potrebná

- detekcia prítomnosti ľudského hemoglobínu v stolici
- vysokocitlivá imunochromatografická metóda (citlivosť 6 µg hemoglobínu/g stolice)



- **výrazne vyššia citlivosť a jednoduchší postup stanovenia v porovnaní s kartičkovými guajakovými testami a stanovením pomocou prístroja**
- jednoduchý odber vzorky do uzatvárateľnej predplnenej odberovej nádoby
- výsledok do 5 minút

výrobca: SureScreen Diagnostics Ltd., Veľká Británia



Najrýchlejšie kvantitatívne stanovenie **CRP** z najmenšieho množstva krvi

Celosvetovo preverená kvalita



Špeciálna AKCIA

do 31.12. 2009

prístroj **NycoCard::: READER II**

829,52 EUR s DPH (24.990 Sk)

- možnosť stanovenia ďalších parametrov podľa použitých testov: **D-dimér • HbA1c • albumín v moči**
- nepretržitá odborná aplikačná podpora
- možnosť bezplatného odskúšania prístroja
- kúpa prístroja aj na splátky



Informácie o ďalších produktoch a objednávky:



**Eurolab Lambda a.s. • T. Milkina 2 • 917 01 Trnava • tel.: 033 5341 448-9 • fax: 033 5443 094
mobil: 0902/938 831 • eurolambda@eurolambda.sk • www.eurolambda.sk**

D • 17.00 – 18.00 – SympóziuM Nycomed – 60 min.

Predsedenstvo: J. Gajdošík, T. Hlavatý

1. MUDr. Tibor Hlavatý – Controloc v ambulancii praktického lekára
2. Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD – Bolesť nepočká - Xefo

• 19.00 – Koncert v kinosále s rautom v kongresovej sále

Piatok 16.10.2009

Kinosála

A • 8.30 – 9.30 – Pneumológia II – 60 min.

Koordinátorka: Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

1. MUDr. Elena Kavcová, PhD. (JLF UK a MFN Martin):
Epidemiológia chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)
2. Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. (JLF UK a MFN Martin):
Súčasná diagnostika a liečba CHOCHP
3. MUDr. Iveta Vaverková (VLD Bratislava):
Manažment CHOCHP pacienta v ambulancii všeobecného lekára

Prestávka 15 min.

B • 9.45 – 10.45 – Chríпка – 60 min.

Koordinátor: D. Sedláková (WHO), P. Lipták (SSVPL)

1. RNDr. Gustáv Russ, DrSc. – Chrípkové vírusy, reálna hrozba.
2. Doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD – Epidémia a pandémia chrípky - správna prax lekára prvého kontaktu, odporúčania WHO
3. Doc. MUDr. A. Liptáková, PhD - Pripravenosť Slovenskej republiky pri ochrane obyvateľstva počas pandémie z pohľadu zdravotníctva.


Prestávka 15 min.

C • 11.00 – 12.00 – Blok WHO – Primárna zdravotná starostlivosť – kľúč k zlepšeniu zdravotníckeho systému – 60 min.

Predsedenstvo:

M. Pellny (WHO/EURO), D. Sedláková (WHO), A. Liptáková (MZ SR),
P. Lipták (SSVPL), Jana Bendová (SSVPL)

1. Primary health care, including health system strengthening
2. Slovak Primary Care Collaboration Program with WHO



FluaRIX™

Dajte sa zaočkovať proti chrípke!

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Fluarix » injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Držiteľ rozhodnutia o registrácii » GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika.

Zloženie » jedna dávka (0,5 ml): Inaktivovaný, štiepený vírus chripky obsahujúci antigény pomnožené na oplodnených slepačích vajíčkach: A/Brisbane/59/2007 (H1N1) variant (A/Brisbane/59/2007 (H3N2) variant (A/Uruguay/716/2007 NYMC X-175C) 15 mikrogramov HA, B/Brisbane/60/2008 variant (B/Brisbane/60/2008) 15 mikrogramov HA. Pomocné látky: chlorid sodný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný, hexahydrát chloridu horečnatého, tokoferolhydrogensukcinát alfa, polysorbát 80, oktoxinol 10 a voda na injekciu.

Farmakoterapeutická skupina » Očkovacia látka proti chrípke, ATC kód: J07B802. **Indikácie »** Profylaxia chripky, hlavne u osôb so zvýšeným rizikom pridružených komplikácií. Použitie Fluarixu sa má zakladať na oficiálnych odporúčaniach. **Kontraindikácie »** Precitlivenosť na liečivá, na niektorú z pomocných látok, na reziduá, na vajce a na kuraciu bielkovinu. Fluarix neobsahuje viac ako 0,05 mik-

rogramov ovalbumínu v jednej dávke. Očkovacia látka môže obsahovať reziduá nasledujúcich látok, napr. formaldehydu, gentamicíniumsulfátu a deoxycholátu sodného. Imunizácia sa má odložiť u pacientov s horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou. **Nežiaduce účinky »** Časté: bolesť, začervenanie, opuch, indurácia, ekchymóza, bolesť hlavy, horúčka, malátnosť, triaška, únava, myalgia, artralgia, potenie. Ďalšie nežiaduce reakcie z postmarketingového pozorovania sú nasledujúce: prechodná trombocytopénia a lymfadenopatia, alergické reakcie, angioedém, neuralgia, parestézia, febrilné kŕče, encefalomyelitída, neuritída, Guillainov-Barrého syndróm, vaskulitída, pruritus, urtikária a nešpecifická vyrážka. **Dávkovanie a spôsob podávania »** Dospelí a deti od 36 mesiacov: 0,5 ml. U detí od 6 mesiacov do 35 mesiacov sú klinické údaje obmedzené, bola použitá dávka 0,25 ml alebo 0,5 ml. Detom mladším ako 9 rokov, ktoré v minulosti neboli očikované, sa má po uplynutí najmenej 4 týždňov podať druhá dávka. Imunizácia sa má uskutočniť intramuskulárnou alebo hlbokou subkutánnou injekciou. **Gravidita a laktácia »** Obmedzené údaje nesvedčia o tom, že by očkovacia látka mala nežiaduci vplyv na plod a matku. O použití sa môže uvažovať od druhého trimestra gravidity. U gravidných žien, ktorých zdravotný stav

zvyšuje riziko vzniku komplikácií spojených s chrípkou, sa podanie očkovacej látky odporúča bez ohľadu na štádium ich gravidity. Fluarix sa môže použiť počas laktácie. **Osobitné upozornenia »** Pre prípad anafylaktickej reakcie musí byť k dispozícii zodpovedajúca lekárska pomoc a dohľad. Fluarix sa nesmie za žiadnych okolností aplikovať intravaskulárne. Tvorba protilátok u pacientov s endogénnou alebo iatrogénnou imunosupresiou nemusí byť dostatočná. **Interakcie »** Fluarix sa môže podať súčasne s inými očkovacími látkami, ale do rôznych končatín. Imunologická odpoveď môže byť znížená u pacientov podrobujúcich sa imunosupresívnej liečbe. **Upozornenia na spôsob skladovania »** Uchovávať v chladničke pri teplote (2°C - 8°C) v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke. Vakcína nesmie byť použitá po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale. **Balenie »** injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke 1x 0,5 ml.

Výdaj lieku » je viazaný na lekársky predpis.

Dátum poslednej revízie textu » 08/2009

Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku.

Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie.

Kongresová sála

A • 8.30 – 9.30 – Hematológia II – Warfarin – 60 min.

Predsedníctvo: M. Hulíková, P. Lipták

1. Prim. MUDr. M. Hulíková, PhD - miesto antikoagulačnej liečby v súčasnosti
2. MUDr. Peter Lipták, MUDr. Dana Buzgová, MUDr. Jaroslava Laňková – Nové kompetencie všeobecných lekárov v prevencii VTE

Prestávka 15 min.

B • 9.45 – 10.45 – Škola odvykania fajčenia – 60 min.

Koordinátor: J. Bendová, E. Jurgová

1. MUDr. Tibor Baška, PhD, MUDr. Elena Kavcová, PhD, MUDr. Miloš Lisý - Využívanie efektívnych postupov odvykania od fajčenia u všeobecných lekárov v dennej praxi – problémy, rezervy a možnosti zlepšenia
2. MUDr.D.Paulovič, Odd. PaF FN Nitra - Je možné nikotinizmus úspešne liečiť?
Champix - videoanimácia
3. MUDr. Eva Jurgová, Europrev Wonca – Majú pacienti záujem o rady lekára v boji proti fajčeniu? Európska štúdia.

Prestávka 15 min.

C • 11.00 – 12.00 – Blok kazuistik a vária – 60 min.

Koordinátor: Z. Nedelková

1. MUDr. Jarmila Platová: Rozbor ochorení a úmrtnosti na onkologické ochorenia v APLD v Kysaku, kazuistika
2. MUDr. Zuzana Nedelková: Epidémia TBC v Drahovciach
3. Prof. MUDr. J.Rovenský,DrSc., MUDr. P. Masaryk, CSc., Ing. M.Stančíková, CSc.: Význam kalcia a vitamínu D nielen v prevencii a liečbe osteoporózy
4. Prof. MUDr. ILLYÉS Miklós, PhD (Budapešť) – Teoretické a praktické otázky merania arteriálnych funkcií

Prestávka na obed 12.00 – 13.00 hod.

Nové MoliCare Mobile: pohodlie ako nikdy predtým

Navliekacie nohavičky pre mobilných
pacientov s ťažkou inkontinenciou

Prispôsobivé

Dokonale sa prispôsobia
každému pacientovi
a neobmedzujú ho
v pohybe.

NOVÉ



Pohodlné a priedušné

Vďaka novému
jemnému materiálu.



Bezpečné

Spôhlivá ochrana
vďaka trojvrstvovému
savému jadru.



Diskrétné

Vďaka molekulám, ktoré
neutralizujú zápach.



Doprajte svojim pacientom komfort a spoľahlivosť **nových MoliCare Mobile!**
Zavolajte a objedajte si vzorky ešte dnes!

MoliCare Mobile sú vhodné **pre ženy aj pre mužov** a sú k dispozícii v **dennom a nočnom** variante.

Vďaka širokému výberu veľkostí sa dokonale prispôbia každému pacientovi.

Veľkosti a varianty:

MoliCare Mobile: XS, S, M, L, XL

MoliCare Mobile Super: M, L

MoliCare Mobile Light: M, L



MoliCare Mobile®

Viac informácií a **VZORKY ZADARMO** pre vašich pacientov získate
na bezplatnej infolinke **0800 100 150** alebo na **www.hartmann.sk**

Kinosála

A • 13.00 – 14.00 – Infektológia – využitie CRP versus spotreba antibiotík – 60 min.

Koordinátor: P. Marko

1. Lars Bjerrum MD, PhD: „CRP measurement in general practice – influence on antibiotic prescribing in patients with respiratory tract infections” - 20min

Associate profesor, coordinator of project HAPPY AUDIT, Senior researcher

Institute of Public Health, IPH, Research Unit of General Practice

2. Rogier Hopstaken MD PhD:

„CRP finger prick in general practice: does it hurt?” - 20 min

general practitioner, researcher, Foundation of Primary Health Care Centers Eindhoven (SGE), The Netherlands

3. Peter Marko, MD, ambulancia všeobecného lekára, Kežmarok

„Klinické skúsenosti s využitím CRP v praxi VLD na Slovensku.“

-20 min

Prestávka 15 min.

B • 14.15 – 15.45 – Všeobecné lekárstvo v okolitých štátoch -prečo je potrebná cezhraničná komunikácia a dobrá spolupráca? – 90 min.

Koordinátor: J. Bendová

1. Poľsko – Dr. Adam Windak, Krakov

2. Ukrajina – Dr. Viktor Biryukov. Odessa

3. Maďarsko – Dr. Imre Rurik, Debrecín

4. Rakúsko – Dr. Gustav Kamenski, Dr. Ulrich Busch,

Ögám – Rakúska spoločnosť pre všeobecné a rodinné lekárstvo

5. Česká republika – Dr. Igor Karen (SVL ČLS JEP)

6. Slovensko – Peter Lipták, Jana Bendová (SSVPL SLS)

Prestávka 15 min.

C • 16.00 – 17.00 – Farmakológia – 60 min.

Koordinátor: K. Chylová

1. MUDr. Peter Lipták - Kategorizačná komisia- kompetencie všeobecných lekárov

2. PharmDr. Dominik Tomek, MPH – Nové onkologické lieky v rokoch

2008 – 2009 a ich ekonomické parametre

3. MUDr. K. Chylová, PhD – Bezpečnosť pacientov, Projekt farmakovigilancie SSVPL

Prestávka 15 min.

C • 17.15 – 19.00 – interaktívna diskusia – MZ, ZP, SSVPL – postavenie segmentu VLD pri financovaní zdravotnej starostlivosti v období krízy finančných zdrojov – 105 min.

Predsedníctvo: A.Liptáková, H.Hupková, R. Roľná, T.Bôrik, J.Gajdošík, P.Lipták, M.Žilinek

1. MUDr. Zuzana Nedelková – Prínos odboru VL, ambulancií všeobecných lekárov a ich vplyv na ekonomiku zdravotníctva.
2. Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD – Pohľad hlavného odborníka MZ SR na úlohy PZS v efektívne fungujúcom systéme zdravotníckej starostlivosti.
3. MUDr. H.Hupková, MUDr. R.Roľná – VŠZP. Financovanie segmentu VLD v období krízy finančných zdrojov. Pohľad VŠZP.
4. RNDr. Miroslav Žilinek – ZP Dôvera. Financovanie segmentu VLD v období krízy finančných zdrojov. Pohľad ZP Dôvera.
5. Ing. Tibor Bôrik, – Union ZP. Financovanie segmentu VLD v období krízy finančných zdrojov. Pohľad Union ZP.
6. MUDr. P.Lipták – Ľudské zdroje v odbore VL.
7. MUDr. P. Makara, MPH – Predpoklady pre efektívne financovanie VLD v SR v roku 2010.

Kongresová sála

A • 13.00 – 14.00 Sympóziu: Infekcie, imunita a ortomolekulový princíp – 60 min.

1. Recidivujúce infekty, slizničná imunita, nové možnosti liečby a profylaxie – (J. Hromec, J.P.Guggenbichler)
2. Možnosti imunoterapie v prevencii infekcií a ich komplikácií (M. Hrubíško)
3. Recidivujúce močové infekcie-imunoterapia, profylaxia- výsledky po 2 a 3 rokoch – (S.Krčméry, J.Hromec)
4. Ortomolekulový princíp- úvod do problematiky, možnosti ovplyvnenia imunity – (I. André, J.Hromec)

Prestávka 15 min.



B • 14.15 – 15.25

Urologický workshop – Hartman-Rico – 70 min.

Koordinátor: J. Marenčák

1. Diagnostika a liečba hyperaktívneho močového mechúra
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD urolog. odd. NSP Skalica
2. Inkontinencia moču a možnosti prevencie a liečenia
MUDr. Ľubomír Lachvác, PhD., Urologická klinika LF UPJŠ Košice
3. Hartmann Rico pomáha pri prevencii, projekt vzdelávania verejnosti o problematike porúch udržania moču, MOLIMED A MOLIKLUB spolu proti ľahkej inkontinencii, Mgr. Miroslava Kanjaková, Brand Manager SR, Hartmann Rico
4. Kegelove cviky, ukážky cvičení, odborný výklad, užitočné a praktické rady pre pacientky Lenka Besedová, fyzioterapeutka

Prestávka 15 min.

C • 15.40 – 16.40 – Sympóziu Valeant – 60 min.

Prevencia myokardiálnej ischémie u stabilnej angíny pectoris-

1. MUDr. František Mikla: Stabilná angína pectoris: patofyziológia, diagnostika a princípy liečby (15 min)
2. Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc: Význam manažmentu arteriálnej hypertenzie pri stabilnej angíne pectoris (15 min)
3. Prof. MUDr. Ján Murín, CSc: Betablokátory a stabilná angína pectoris

• 20.00 – 24.00 – Spoločenský večer SSVPL SLS

– účinkuje Latino Flash Miguela Méndeza a kapela Casio z Piešťan

Sobota 17. 10. 2009

Kinosála

A • 8.00 – 9.00 – Pracovná skupina pre respirológiu.

Spiroprojekt SSVPL – 60 min.

Predsedsníctvo: J. Bendová, B. Šperková, I. Vaverková

1. Naša skupina pneumológov VLD, členstvo v IPCRG (International, primary care respiratory group)
2. MUDr. Blanka Šperková (Všeobecná lekárnica Poprad): Diferenciálna diagnostika perzistujúceho dráždivého kašľa
3. Spiroprojekt, ako sa zapojiť.

Prestávka 20 min.

B • 9.20 – 10.20 – Onkológia – 60 min.

Koordinátor: V.Ballová, K.Dostálová

1. MUDr. M. Karaba - Karcinóm prsníka, spolupráca chirurga a praktického lekára
2. MUDr. V. Ballová - Ako neprehliadnuť myelom.
3. MUDr. K. Dostálová - Žilová trombóza ako paraneoplastický jav
4. MUDr. P. Lipták, L. Kostková - Preventívne onkologické programy SSVPL

Prestávka 20 min.

C • 10.40 – 11.40 – HP – Testuj a lieč – workshop – 60 min.

Koordinátor: L. Kostková

1. MUDr. Lenka Kostková – súčasný stav projektu HP- testuj a lieč.
2. Doc. MUDr. Bohumil Seifert PhD (SVL ČLS JEP) – Starostlivosť o pacientov s dyspepsiou horného typu v ČR.

Prestávka 20 min.

D • 12.00 – 13.00 – Psychiatria – workshop - 60 min.

Predsedníctvo: H.. Korcsogová, P. Korcsog, N. Makarová, P. Makara

1. Prim. MUDr. Peter Korcsog, MUDr. Niké Makarová – Manažment psychiatrických diagnóz, rozdelenie práce medzi všeobecného lekára a psychiatra.
2. MUDr. Helena Korcsogová, MUDr. Peter Makara – kazuistiky psychiatrických pacientov
3. PharmDr. Dominik Tomek, MPH – Farmakoeconomika a náklady na antidepresíva – pohľad spoločnosti a pohľad zdravotnej poisťovne

Kongresová sála

A • 8.00 – 9.00 – Vyšetrovanie ciev – workshop – cievny projekt SSVPL – 60 min.

Koordinátor: J. Kaňuch

MUDr. K. Dostálová, MUDr. J. Kaňuch, MUDr. P. Lipták

Prestávka 10 min.



B • 9.10 – 10.40 – Resuscitácia – workshop – 90 min.

Koordinátor: MUDr. Anton Hanušín

– praktická demonštrácia a nácvik súčasných resuscitačných postupov na figurínach s využitím počítačovej simulácie

Prestávka 10 min.

C • 10.50 – 11.50 – Očkovanie – workshop pracovnej skupiny pre očkovanie SSVPL – 60 min.

Koordinátor: Z. Košťálová

1. MUDr. RNDr. Ján Mikas – predseda imunizačnej komisie ÚVZSR
2. MUDr. Peter Lipták, člen imunizačnej komisie za VLD, MUDr. Zuzana Košťálová – expert SSVPL na očkovanie - Očkovanie v praxi všeobecných lekárov pre dospelých, aktuálne problémy, aktuálne anti-vakcinačné aktivity.
3. MUDr. Ivan Bakoš: Očkovanie proti hepatitíde B pri chronických ochoreniach – nové odporúčania.

Prestávka 10 min.

D • 12.00 – 13.30 – Všeobecné lekárstvo je sexi! – workshop pre mladých všeobecných lekárov, Vasco da Gama – 90 min.

Koordinátori: Jana Bendová, Lenka Bachratá, Kateřina Sklářová(-ČR), Tomáš Kubříčan(USA)

Prestávka na obed 13.00 – 14.30 hod.

Kongresová sála

A • 14.30 – 16.30 Interaktívny workshop problémy VL, vzdelávanie, súčasnosť a budúcnosť PZS – členská schôdza SSVPL – 120 min.

Koordinátor: MUDr. P. Lipták- prezident SSVPL

1. Organizácia postgraduálneho vzdelávania VLD, využitie eurofondov, praktický postup (MUDr. Ľudmila Lysinová, lekárka banskobystričského samosprávneho kraja, MUDr. Katarína Naďová, lekárka trnavského samosprávneho kraja, PhDr. Kvetoslava Beňušová, MPH, MZ SR)
2. Problematika organizácie LSPP
3. Súčasnnosť a budúcnosť PZS na Slovensku

4. Podpora WHO a EFPC, globálna stratégia rozvoja primárnej starostlivosti.
5. Globálna stratégia rokovaní so zdravotnými poisťovňami a s MZ SR.
6. Zapojenie do medzinárodných sietí Wonca v Európe, výzva pre slovenských všeobecných lekárov. (EURACT – výučba VL, EUROPREV – prevencia, EGPRN-veda, Vasco da Gama- mladí, EQUIP- kvalita, EURIPA- vidiecke praxe)
7. Schválenie deklarácie všeobecných lekárov.

B • 16.30 – Ukončenie konferencie.

Primárna zdravotná starostlivosť, kľúč k zlepšeniu zdravotníckeho systému

NAPÍŇAME CIELE WHO

www.who.sk
www.euro.who.int
www.who.int



SME ČLENMI ORGANIZÁCIÍ

WONCA – www.woncaeurope.org
www.globalfamilydoctor.com



EFPC – www.europrimarycare.org



Všeobecní lekári využívajú v starostlivosti o pacienta ten najsofistikovanejší nástroj, ľudskú bytosť...

XXXI. Výročná konferencia SSVPL SLS

Banská Bystrica, 21. – 23. 10. 2010



Nastal čas na zmenu.

Naše konferenčné aktivity sa po rokoch sťahujú z Bojníc do stredného Slovenska, do Banskej Bystrice. Chceme, aby kvalitné vzdelávanie, o ktoré sa usilujeme, bolo dostupné všeobecným lekárom rovnako z celého Slovenska. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Výbor SSVPL SLS