

Manažment HP pozit dyspepsie v ambulanciách VPL na Slovensku - stratégia testuj a lieč.



www.vpl.sk


P. Lipták, L. Kostková, I. Vaverková, J. Bendová, M. Fedorová,
S. Ostrovska, D. Tarinova, I. Machacova, E. Sedlakova, P. Zvak

Slovak Society of GP

Bojnice 16.10.2008


Populačná pyramída Slovenska

2001-2006



**Primárna starostlivosť na Slovensku je rozdelená,
hranicou je vek 18 rokov**

Sieť VLD na SLovensku




2 331 VLD

(4 milióny občanov nad 18 rokov)


Epidemiológia HP na Slovensku *

- HP pozitivita 30-40%
- Dvanáctnikový vred 10 %
- Vred žalúdka 5 %
- Rakovina žalúdka 1-2 %
- Lymfóm žaludka menej ako 1%



<http://www.hpylori.com.au/>

Čo dnes môže poskytnúť VL pacientovi?



Helicobacter pylori

Horný tráviaci systém - dyspepsia horného typu

- Bez alarmujúcich príznakov, do 45 rokov, vyšetří a lieči aj všeobecný lekár.
- Vyšetrenie zo stolice je rovnako citlivé a spoľahlivé ako dychový test alebo GFS.
- Po zistení positivity a pri ťažkostiach trojkombinácia – liečba kombináciou dvoch antibiotík a lieku na odstránenie žalúdočnej kyseliny.
- Po tejto kúre je pacient väčšinou vyliečený a je bez ťažkostí, nevyžaduje žiadnu ďalšiu starostlivosť.
- úspešnosť liečby si overíme vyšetrením stolice o 6-8 týždňov.
- Dnes u týchto pacientov nie je potrebná gastrofibroskopia ani drahý dychový test s rádioaktívnou látkou.



Projekt HP testuj a lieč - časové intervaly projektu

- Projekt začal od začiatku roku 2008
- Naštartoval ako pilotný projekt v 10 VLD praxiach v SR
- Predstavili sme ho na konferenciách V L'ubljeni a v Istambule
- V 2009 ho plánujeme implementovať do rutínnej praxe v ambulanciách VLD na SLOvensku



Používaný laboratórny test

- Vyšetrovanie HP pozitivity- vyšetrenie antigénu HP zo stolice sa zaviedlo do rutinnej laboratórnej praxe v SR od jesene 2007
- Používaná metóda má senzitivitu 94 % a špecificitu 98 %*, podobne ako dychový test **
- Vyšetrenie preplácajú laboratóriám zdravotné poisťovne
- Jedno vyšetrenie antigénu na HP v stolici stojí v SR asi 7 EUR vs. 100 EUR za jeden dychový test



* II.Recommendation of Slovak gastroenterology Association, 9/2007.


** Maastricht III -2005 consensus

Metodika

- U pacientov nad 45 rokov, trpiacich na dyspepsiu horného typu, bez alarmujúcich symptómov vyšetríme stolicu na HP antigén
- Ak je nález pozitívny, pacienta liečime podľa Maastricht III konsenzu v I. línii.
- Následné kontrolné vyšetrenie po ukončení liečby realizujeme po dvoch mesiacoch od jej ukončenia.
- V prípadoch pretrvávajúcej pozitivity preliečime pacienta opakovane podľa odporúčaní Maastricht III konsenzu štvorkombináciou v druhej líni. Kontrola eradikácie znova po dvoch mesiacoch od ukončenia liečby.
- **Protokol** – všetko je sprístupnené na www.vpl.sk ...



10 pilotných HP centier v SR



Doterajšie výsledky pilotného projektu

Počet centier	10
Počet testovaných pacientov	103
Počet HP pozit / Počet eradikovaných po 1.línii liečby	33 / 24
Počet HP-pozit. po 1.línii liečby	9
Počet eradikovaných prípadov po 2.línii liečby	4
Počet pacientov asymptomatických po liečbe	25
Počet ukončených protokolov	98

Ciele

- **Hlavný cieľ je implementácia tohto nového prístupu do rutínnej praxe VLD.**



Ďakujem za pozornosť.



lipp@pobox.sk