

CRP prístroj v ambulancii praktického lekára a
jeho praktické využitie.
MUDr. Marián Sivoň, Zdravotné stredisko
Popudinské Močidl'any

Využitie v praxi

- CRP ako zápalový marker
- CRP u pacientov s AIDS, pacientov liečených cytotoxickými liečivami, kortikosteroidmi alebo ožarovaním
- CRP po transplantáciách orgánov
- Nekróza pri akútnom infarkte myokardu

Ambulancie všeobecných lékařů

- diagnostické rozhodovanie;
- v prípade akútnych infekčných ochorení: infekcie horných dýchacích ciest;
- pľúcne infekcie;
- infekcie močového traktu;
- infekčné ochorenia u gravidných pacientiek;
- bakteriálne superinfekcie.

Indikácie na stanovenie hladiny

CRP:

- vírusová versus bakteriálna infekcia horných dýchacích ciest;
- tracheobronchitída versus bronchopneumónia;
- pneumónia/bronchitída verzus CHOCHP alebo kardiálna insuficiencia;
- akútna cystitída verzus akútna pyelonefritída; ulcerózna kolitída verzus morbus Crohn;
- reumatoidná artritída verzus systémový lupus erythaematosus;
- febrility neznámej etiológie; monitorovanie efektivity antibakteriálnej liečby.

Akútne ochorenia dýchacích ciest

- Sinusitída
- Faryngitída
- Bronchitída
- Pneumónia

Kazuistiky v našej ambulancii

- Robíme CRP väčšinou pri výskyte infektu dých.ciest a zváženia podania ATB liečby. Nemám možnosť skontrolovať dynamiku, nakoľko pacient by musel prísť na druhý deň na ambulanciu a posíťovne výkon/okrem Union/ neuhrádzajú.

1.

- Muž nar. 1954-onkol.pacienta C34 l.dx+ st.p.operácii patol.fract.th12 FW 153/ pri zákl.ochorení + KO Leu 13,4 + pokles v červ.zložke Ery 3,76 Hb 97 Htk 0,303 nasadený parametre z kliniky-u nás dorobené CRP 132, ktoré v porovnaní s klinickými hodnotami stúpa, preto nasadený Amoksklav
- Nález.oroph.kludný, TO, Lu nezv.dých.vpravo oslabené, vľavo zostrené bez vedl.fenomenov.

2.

- Mladý muž 1990, OA-bez ťažkostí neliečený
- od soboty večera/2.deň/ bolesti v krku teplota nie, bral ATB pred 3týdnami Klabax
- t.č. obj.dysfonia, oroph.nastreknutý, To mierne zv. LU hmat dých.čisté bilat odoberam CRP pod 8-pacient poučený o povahe ochorenia ATB neindikované

3.

- onko pacient žena-1976, roziahly Ca žalúdka adenocarcinom ventriculi G3 st.p.resekcii,adnexotomii bilat,protper TU ovari bilat st.p.omentectomiam MTS Carconosis cavi perit,Tu ovarii bilat
- bolesti v krku asi 3 dni,predtým brala ATB na klinike z dôvodu operačných zákrokov preto odoberam CRP
- obj.dých.čisté,oroph.nastreknutý,TO,Lu nezv. CRP pod 8 ATB t.č. nenasadzujem ko dľa stavu – nebolo indikované ani s odstupom času.

4.

- žena 1948-OA.varixy-venotoniká,sledovaná ALG pre poruchu imunity def.specif. cel.imunity
- zdeň od piatka teploty do 38 kašel,dysfonia
- obj.oroph.nastreknúýt,To nez v LU hmat vysadené antihistaminiká
- CRP 21 vzhľadom ku klinike a predchádzajúcim skúsenostiam podávam
- ATB



Záver