

Hepatitída C v ambulancii VL

MUDr. Patrícia Eftimová, MPH
Bratislava

Vysoké Tatry, október 2012

Hepatitída C v ambulancii VL *... reálie*


ambulancia VL

veľké mesto

klientela

10 anti HCV+/366 vyšetrených sér

Hepatitída C v ambulancii VL dôležité fakty




„Čas je nepriateľ“

Hepatitída C v ambulancii VL cesta pacienta

Symptomatický pacient

ŠAS

PAS



Únava
Artralgie
Ikterus
Nechutenstvo
Nauzea
pruritus

Anti HCV+

NÚ liečby
Paralelné ochorenia

Preventívne prehliadky
Posudková činnosť
Očkovanie
Paralelné ochorenie

Hepatitída C v ambulancii VL cesta pacienta

aSymptomatický pacient

ŠAS

PAS

- preventívne prehliadky
- na vlastnú žiadosť
- dif. dg. hepatopatia (USG,HT)
- stratifikácia AH,
- monitoring liečby statínmi,
- pred OV,
- rizikové skupiny obyvateľstva



Rizikové skupiny

- vyšší výskyt rizika HCV
(HIV, hemofília s TAT pred 1987,
elev. HT, hemodialýza)
- i.v. Drogy
- TAT pred rokom 1982
- deti matiek HCV
- zdravotnícki pracovníci
(i.v. pichnutie,
potriesnenie
kontaminovanou krvou)

Hepatitída C v ambulancii VL cesta pacienta

aSymptomatický pacient

ŠAS

PAS

- preventívne prehliadky
- dif. dg. hepatopatia (USG,HT)
- stratifikácia AH,
- monitoring liečby HLP
- pred OV,
- na vlastnú žiadosť
- rizikové skupiny obyvateľstva

Anti HCV+

Ročník 9

Marec 2005

Číslo 1

METODICKÝ LIST RACIONÁLNEJ FARMAKOTERAPIE

6. Pri úvode a každej zmene farmakologickej liečby DLP je nutná kontrola hladín lipidov, hepatálnych enzýmov a kreatinínu počas užívania hypolipemika v priebehu 4-6 týždňov liečby.
7. Po nastavení pravidelné 3-4-mesačné kontroly lipidov, hepatálnych enzýmov a kreatinínu.

Hepatitída C v ambulancii VL cesta pacienta

aSymptomatický pacient

ŠAS

PAS

- preventívne prehliadky
- dif. dg. hepatopatia (USG,HT)
- stratifikácia AH,
- monitoring liečby HLP
- pred OV,
- na vlastnú žiadosť
- rizikové skupiny obyvateľstva

Anti HCV+

NÚ liečby

Paralelné ochor

Nežiadúce účinky


- flu like sy (*horúčka, triaška, bolesti hlavy, kĺbov, svalov,*
- leukopénia,
- trombocytopénia
- autoimunitné och.
- alopecia,
- neuropsychiatrické (*riziko suicídia*)
- kardiomyopatia,
- pľúcna fibróza,
- retinopatia,

Hepatitída C v ambulancii VL cesta pacienta

Posudková činnosť

z

- DPN
- invalidita (zákon o sociálnom poistení)
- posúdenie ZS na výkon konkrétnej činnosti



Preventívne prehliadky
Očkovanie

Posudková činnosť

Očkovanie
Paralelné ochorenie

Hepatitída C v ambulancii VL cesta pacienta

Očkovanie

§ 9 Odporúčané očkovanie osôb,

ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz


(1) Ak lekár⁹⁾ rozhodne o potrebe očkovania proti chrípke,
očkovanie sa uskutoční u

a) detí od šiestich mesiacov života do 12 rokov,

b) osôb 59-ročných a starších,

c) osôb dispenzarizovaných bez ohľadu na vek so
závažnými chronickými ochoreniami
dýchacích ciest, srdcovocievneho systému,

metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.



Preventívne prehliadky

Posudková činnosť

Očkovanie

Paralelné ochorenie

Hepatitída C v ambulancii VL cesta pacienta


Očkovanie

§ 9 Odporúčané očkovanie osôb,

ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(3) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti vírusovému zápalu pečene typu B, očkovanie sa uskutoční u

- a) osôb dispenzarizovaných pre chronické ochorenia pečene,
- b) hemofilikov,
- c) diabetikov,
- d) osôb s cystickou fibrózou,
- e) intravenózných narkomanov,
- f) homosexuálov,
- g) promiskuitných osôb



Preventívne prehliadky
Posudková činnosť

Očkovanie

Paralelené ochorenie

Hepatitída C v ambulancii VL cesta zdravotníka



Hepatitída C v ambulancii VL (všetky cesty vedú do)

Ďakujem za pozornosť

