

Využitie vlastnej krvi pri liečbe ochorení pohybového aparátu

Mgr. Tatiana Harhovská
Ortopedická ambulancia
Poprad

Terapia s ACP- Autológna kondiciovaná plazma

- terapeutické využitie vlastnej krvi v liečbe ochorení pohybového aparátu.
- ACP-Autológna kondiciovaná plazma vzniká odberom asi 10 ml krvi pacienta a následnej centrifugácii trvajúcej asi 5 minút, pričom dôjde ku separácii červených a bielych krviniek od plazmy s koncentrovanými krvnými doštičkami

INDIKÁCIE:

- ruptúra ligamentov
- zápaly šliach a ligamentov
- natrhnuté svaly
- defekty chrupavky I. – III. Stupňa
- poškodenia rotátorovej manžety
- opätovné natrhnutie ACL, PCL
- poranenia menisku
- stavy po operáciách

Set potrebný na aplikáciu ACP:



Po aplikácii ACP

- mierna bolestivosť v oblasti vpichu-analgetiká
- nesteroidné protizápalové lieky - zakázané počas liečby
- obmedzenie fyzickej aktivity asi na 24 hodín po aplikácii
- 60% redukcia bolesti po 8 týždňoch
- 80% redukcia bolesti po 6 mesiacoch

Výhody ACP terapie

- použitie prirodzenej schopnosti regenerácie tela
- pri liečbe šliach, svalov, kĺbov a kĺbovej chrupky
- koncentrácia rastových faktorov v krvi
- na liečbu poranenia využíva ACP schopnosti Vášho tela
- bezpečnosť výkonu je zaručená dvojitou striekačkou

Nevýhody ACP terapie

- táto liečba nie je v súčasnosti hradená zdravotnými poisťovňami

Ďakujem za pozornosť!